NIDEK

CAS CLINIQUES

GONIOSCOPE GS-1

Gonioscope GS-1

Rappel anatomique des structures de l'angle irido-cornéen



Angle irido-cornéen ouvert

Les différentes structures anatomiques de l’angle irido-cornéen sont bien visibles

Avec l’aimable autorisation du Professeur Jean-Paul Renard, Paris

Glaucome chronique par fermeture de l’angle



Avec l’aimable autorisation du Professeur Jean-Paul Renard, Paris

Glaucome chronique par fermeture de l’angle

SYNÉCHIES ANTÉRIEURES



Zones d’adhérence de l’iris au niveau du trabéculum. Elles sont à l’origine d’une fermeture progressive de l’angle. Elles risquent de perturber la fonctionnalité de l’angle irido-cornéen.

Avec l’aimable autorisation du Professeur Jean-Paul Renard, Paris

Angle irido-cornéen ouvert



Angle irido-cornéen d’un fort myope



Angle irido-cornéen ouvert.
La bande ciliaire est bien visible.

Tumeur irido-ciliaire



Tumeur ciliaire pigmentée étendue à l'angle irido-cornéen.

Avec l'aimable autorisation du Professeur Jean-Paul Renard, Paris

Polykystose du corps-ciliaire



Polykystose du corps ciliaire avec fermeture partielle de l'angle irido-cornéen

Avec l'aimable autorisation du Professeur Jean-Paul Renard, Paris

MIGS
(Minimally Invasive Glaucoma Surgery)

Chirurgie mini-invasive du glaucome avec implantation d'un système de drainage de l'humeur aqueuse

Matériel MIGS



Matériel MIGS

Avec l'aimable autorisation du Professeur Jean-Paul Renard, Paris.

Naevus malin de l’iris apparu en quelques années

Avec l’aimable autorisation du Professeur Jean-Paul Renard, Paris

Malformation congénitale



Syndrome d’Axenfeld Rieger.

Avec l’aimable autorisation du Professeur Jean-Paul Renard, Paris

Contrôle de chirurgie filtrante (trabéculectomie)

Avec l'aimable autorisation du Professeur Jean-Paul Renard, Paris

Iridotomie périphérique + MIGS



Avec l'aimable autorisation du Professeur Jean-Paul Renard, Paris

© NIDEK SA-MKT-DOC-86-V01-juin 2021